

BERNINA sarı kabuk ve sarı et rengiyle yemeklik bir patates çeşididir.

- BERNINA sarı kabuk ve sarı et rengiyle yemeklik bir patates çeşididir.
- BERNINA yumrular oval uzun, iri ve yüzlek gözlüdür.
- BERNINA yumru sayısı homojen verimi yüksektir.
- BERNINA pazarlanabilir yüksek verime sahiptir.



ÜRÜNÜN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Yetiştirme tipi

Yemeklik

Hastalıklara Dayanıklılık

Altın Kist Nematod : RO 1 and 4	Dayanımı yüksek
Adi uyuz	Dayanımı yüksek
Yumru geç yanıklığı	Hassas
Yaprak geç yanıklığı	Hassas
Spraing	Hassas

Bitki Özellikleri

Olgunluk Dönemi

Orta Erkenci

İlk Gelişimi

Hızlı

Çiçek Rengi

Beyaz

Yumru Özellikleri

Kabuk rengi

Sarı

Et rengi

Koyu Sarı

Yumru şekli

Oval, uzun

Yumru Boyutu

İri boy

Göz Derinliği

Yüzlek

Kuru Madde Oranı

%18

Pişme Tipi

AB

Mekanik Hasara Dayanımı

Dayanımı yüksek

Bruising

Dayanımı yüksek

Uyku dönemi

Uzun



Gübreleme önerileri

Gübreleme

Azot: standard uygulama -%10

Fosfor: standard uygulama

Potasyum : standard uygulama

Tohum Bakımı

Yumrular soğuk hava deposundan çıkarıldıktan sonra direk dikilmemelidir. İyi yumru sayılarına sahip olmak için dikimden önce filizlendirme yapılmalıdır. Apikal sürgün ucunun kırılmasından sonra diğer gözlerin uygun şekilde sürmesi sağlanmalıdır. Dikim derinliği diğer çeşitlere kıyasla 3 cm daha derine yani 20 cm dikilmesi önerilir.

Toprak sıcaklığı min. 12°C olmalıdır.

NOT: Patates tohumları kesinlikle kesilmemelidir.

Gübreleme miktarı toprak analizine göre değişir.

Yabancı Ot İlacı Uygulaması

Metribuzin aktif maddeye sahip etken maddenin çıkış öncesi kullanılması tavsiye edilir. Kullanılacak toplam dozajın 2 uygulamaya bölünmesi önerilir.

Mantar İlaçlama

Geç yanıklığa karşı hassas olan BERNINA'nın düzenli şekilde fungusit ilaçlama programı yapılması ve takibi tavsiye edilir.



Hasat ve Depolama



Hasat

BERNINA iyi derece de kabuk bağladıktan sonra hasat edilmesi tavsiye edilir.

Depolama

BERNINA uzun bir uyku dönemine sahip olmasından dolayı 4 C uzun dönem depolanabilir.